

Februar 2015, Nanna Læssøe

## Utsigtet hændelse: vurdering af gestationsalder og se-HCG

### Case

Pt. kommer med mistanke om graviditet, dog flere negative test hjemme. Pt. henvises ved næste besøg til blodprøve for se-HCG. Ved svar konstateres graviditet, som er uønsket. Det vurderes, at pt. er 2-3 uger henne og hun henvises til provokeret abort.

På gynækologisk amb. viser det sig, at pt. er 15 uger henne, så hun skal i samråd om senabort. Tolkning af se-HCG kunne have afsløret hvor langt pt. virkelig var henne, og hun kunne have nået provokeret abort inden 12. uge.

### Analyse fra praksis

Pt. kom med blandet symptombillede, og oplyste at dato for sidste menstruation var 2-3 uger tidligere. Der kunne være taget en urin-HCG i praksis allerede her.

Pt. venter et stykke tid med at få taget se-HCG blodprøven. Da svaret foreligger konstateres graviditet, men det overses hvor høj HCG er - pga. forkert aflæsning eller forglemmelse. Det ville have været godt at slå se-HCG værdien op igen inden henvisning til provokeret abort.

### Læring fra praksis

Fast konference mellem reservelæge og tutorlæge inden henvisning til provokeret abort. Ved mistanke om graviditet foretages altid egen test i praksis med urin-HCG.

Afslutningsvis en stor tak til rapportørerne af ovenstående og andre cases. Læringen fra hændelsen er hermed givet videre.

Utsigtede hændelser rapporteres på [www.dpsd.dk](http://www.dpsd.dk)

Patientsikkerhedsenheden  
Kvalitet og Udvikling  
Alleén 15, Sorø  
patientsikkerhed@regionsjaelland.dk