



Ordination af opioider med fokus på depotopioider for ydernr [REDACTED]

Samlet forbrug af opioider

Denne statistik omfatter ordination af depot morfin, tramadol og oxycodon til egne patienter. Nedenstående tabel viser den mulige besparelse ved valg af billigste morfin depotopioid. I beregningen af den mulige besparelse indgår både sygesikringens og patientens udgift.


3. kvartal 2020	Den samlede udgift i din praksis	Den samlede udgift ved billigste analog	Mulig besparelse
Opioider	34.611	8.126	26.485

Depotopioiders andel af forbruget

Depotopioider anbefales ved indikation for behandling af smerter med opioid, da de er forbundet med færre gennembrudssmerter og mindre euforiserende effekt. Nedenstående tabel viser depotopioiders (depottabletter og -kapsler) andel af det samlede forbrug af opioider din praksis og i regionen.


3 kvartal 2020	ATC/ Lægemiddelstof	Andel i din praksis	Andel i regionen
Definerede døgndoser	Depotopioider	86,9 %	76,9 %
Regionens udgift	Depotopioider	84,1 %	73,3 %

Mulig besparelse pr. 1000 patienter



Din mulige besparelse pr. 1000 patienter i forhold til kolleger ved valg af billigste depot morfin.

Den procentvise andel (DDD)



Depotopioiders andel af opioid-forbruget opgjort i definerede døgndoser (DDD).

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Lægemiddelenheden på Imenheden@regionsjaelland.dk